



VITA CHEMIE

FERTILIZERS & TECHNICAL MEANS



ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΘΡΕΨΗΣ & ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Η επιστήμη του αύριο
αποδίδει στο σήμερα



VITA CHEMIE

FERTILIZERS & TECHNICAL MEANS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ VITA CHEMIE

4

ΑΖΩΤΟΥΧΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

- KORAL-S

6

ΕΙΔΙΚΑ ΚΟΚΚΩΔΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

- FERTILSOLE HUMUS • SOLFERRO • HUMICRO

7

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ - ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

- AGRISOL PLUS NPK WS • AGRIVITA 0-0-51
- AGRIVITA 13-0-46 • AGRIVITA CALCIO • AGRIVITA FUR
- AGRIVITA MAP • AGRIVITA MKP • AGRIVITA NPK WS
- GEOTREL ΜΙΓΜΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ • FOGLIARE

10

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΡΕΨΗΣ - ΛΙΠΑΝΣΗΣ

- MAXYFLOR • LIQUID HUMUS • FERTALIQ CAMA
- WHITEFER • VITAFER WG

20

ΜΥΚΟΡΡΙΖΕΣ - ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

- NAUTILUS • NEMO PLUS • NEMASIR NEW • RUSTOP
- MATA FLY • HUMOSPRINT Ca • MULTIACTION MYCO

26



Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΧΩΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Η VITA CHEMIE ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΘΡΕΨΗ-ΛΙΠΑΝΣΗ
ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ VITA CHEMIE

Η **VITA CHEMIE** με έδρα την Θεσσαλονίκη, αποτελεί μια Ελληνική δυναμική εταιρεία ποιοτικών λιπασμάτων, θυγατρική του Ιταλικού εταιρικού group **SIRIAC srl**.

Η **VITA CHEMIE** διαθέτει μονάδα παραγωγής blended λιπασμάτων καθώς και συσκευασίας όλων των λιπασμάτων, με σκοπό την προώθηση των προϊόντων της εκτός της Ελλάδος και σε χώρες των Βαλκανίων και Κύπρο.

Η εταιρία διακινεί όλα τα προϊόντα θρέψης - λίπανσης των καλλιεργειών καθώς και εξειδικευμένα προϊόντα για ειδικές περιπτώσεις τροφопενιών των καλλιεργειών.

Επίκεντρο της αποστολής μας είναι η προσοχή στις απαιτήσεις των παραγωγών, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, τεχνική υποστήριξη, άμεση εξυπηρέτηση και ετοιμότητα στο να απαντήσουμε σε όλα τα νέα αιτήματα που προέρχονται από την έναρξη της καλλιέργειας μέχρι την συγκομιδή.



ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ SIRIAC SRL

Η **SIRIAC srl** ξεκίνησε το 1974, εμπνευσμένη από την ανάγκη στο να συνεισφέρει εποικοδομητικά στη διάθεση λιπασμάτων, σε μια στιγμή μεγάλων μετασχηματισμών των χημικών βιομηχανικών μονάδων. Η εγκατάσταση παραγωγής έχει έκταση 220.000 m² εκ των οποίων περίπου τα 70.000 m² είναι στεγασμένα, αντιπροσωπεύοντας τη μεγαλύτερη μονάδα στη νότια Ιταλία στον αγροτικό τομέα.



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η τεχνική ομάδα της **SIRIAC** εφαρμόζει μια πρωτοποριακή έρευνα στον αγρό για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, προκειμένου να προσφέρει προϊόντα προσαρμοσμένα στις πλέον σύγχρονες απαιτήσεις παραγωγής, σε στενή συνεργασία με ειδικευμένους φορείς έρευνας και πειραματισμού τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ακριβείς διαγνωστικές έρευνες, που διεξάγονται στο δικό μας εξοπλισμένο εργαστήριο, απευθύνονται σε εισερχόμενες πρώτες ύλες που προορίζονται για παραγωγή. Η **SIRIAC** διεξάγει επίσης αναλυτικές δοκιμές και επιτόπιους ελέγχους για την επαλήθευση της πραγματικής απόδοσης των λιπασμάτων της και των παραγόμενων προϊόντων στην αγορά.

Η **SIRIAC** έχει προσαρμόσει όλες τις διαδικασίες ποιότητας που απαιτεί η αγορά από κορυφαίες εταιρείες και έχει λάβει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Τα προϊόντα έχουν αναπτυχθεί και εισαχθεί με καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές, με στόχο:

- τη βελτίωση της ανταπόκρισης στις νέες ανάγκες της σύγχρονης γεωργίας ακριβείας με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο
- την μεγαλύτερη ορθολογικότητα των χρήσεων για τη βελτίωση της αγρονομικής αποδοτικότητας που διασφαλίζει την αγρονομική γονιμότητα των εδαφών, και τη διατήρησή τους
- την υγιή κατάσταση των φυτών και τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο περιβάλλον

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην υιοθέτηση σκευασμάτων με τεχνολογίες που εφαρμόζονται στα λιπάσματα, όπως: ελεγχόμενη δράση, σκευάσματα με τεχνολογίες για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών και την ανάπτυξη των κατάλληλων μεθοδολογιών εφαρμογής λιπασμάτων.

KORAL-S

ΚΟΚΚΩΔΕΣ ΑΖΩΤΟΥΧΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

ΤΥΠΟΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ KORAL-S

KORAL 30 S 30-0-0+38S03

KORAL 33 S 33-0-0+2MgO+3Fe+0,02Zn+0,2Mn+9S03

KORAL 40 S DRIP 40-0-0+14S03

KORAL 40 S 40-0-0+1,5Fe+0,01Zn+0,1Mn+6S03



ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Η σειρά KORAL-S είναι ειδικά κοκκώδη αζωτούχα λιπάσματα, που χρησιμοποιούνται με συνήθη διασκορπισμό, παρέχοντας στο φυτό όλο το άζωτο προοδευτικά περιορίζοντας τις απώλειες. Μέσω μιας σύγχρονης τεχνολογίας η οποία επιτρέπει την προοδευτική απελευθέρωση των θρεπτικών ουσιών έχει ως αποτέλεσμα να παρέχει συνεχώς στο φυτό αυτό που χρειάζεται με στόχο την υψηλή απόδοση.
- Η νέα τεχνολογία, είναι βασισμένη σε μια ειδική όξινη προσθήκη ικνοστοιχείων η οποία βοηθάει να αποφεύγονται οι μεγάλες απώλειες αζώτου με διάφορα πλεονεκτήματα όπως:
 - οικονομικά, λόγω μικρότερης κατανάλωσης λιπασμάτων
 - λιγότερων επεμβάσεων με λιπάνσεις
 - καλύτερης απόδοσης των θρεπτικών ουσιών
 - συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος ελαχιστοποιώντας τις απώλειες αζώτου στον υδροφόρο ορίζοντα προστατεύοντας το λεγόμενο οικοσύστημα.
- Είναι ρυθμιστές του PH του εδάφους
- Ιδανικά για αλκαλικά και αλατούχα εδάφη
- Εμπλουτισμένα με Ικνοστοιχεία

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΕΠΟΧΗ	ΔΟΣΗ
Κηπευτικά υπό κάλυψη	Μεταφύτευση	2-5 κιλά/στρ.
Κηπευτικά υπαίθρια	Μεταφύτευση	20-40 κιλά/στρ.
Ανθοκομικά	Μεταφύτευση	10-30 κιλά/στρ.
Καλαμπόκι	Εμφάνιση σταχυών	15-20 κιλά/στρ.
Σιτηρά	Πλήρη ανάπτυξη	12-15 κιλά/στρ.
Ελιά	Έναρξη βλάστησης	20-40 κιλά/στρ.
Αμπέλι	Έναρξη βλάστησης	20-40 κιλά/στρ.
Φρούτα	Έναρξη βλάστησης	10-30 κιλά/στρ.
Εσπεριδοειδή	Έναρξη ανθοφορίας	10-30 κιλά/στρ.
Ακτινίδιο	Έναρξη βλάστησης	25-35 κιλά/στρ.
Πατάτα	Μετά την βλάστηση	25-50 κιλά/στρ.



FERTILSOLE HUMUS

ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ
ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ

7-14-21+2Fe+20S03

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Άζωτο (N)	ολικό	7%
Άζωτο (N)	αμμωνιακό	7%
Φώσφορος (P2O5)	ολικός	14%
Διαλυτός σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο και σε νερό		100%
Διαλυτός σε νερό (P2O5)		86%
Κάλιο (K2O)	ολικό διαλυτό σε νερό	21%
Θειικός ανυδρίτης (SO3)	διαλυτός σε νερό	20%
Σίδηρος (Fe)	ολικός	2%
Άνθρακας Βιολογικής προέλευσης (C)		7,5%

14-7-7+2Fe+20S03

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Άζωτο (N)	ολικό	14%
Άζωτο (N)	αμμωνιακό	14%
Φώσφορος (P2O5)	ολικός	7%
Διαλυτός σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο και σε νερό		100%
Διαλυτός σε νερό (P2O5)		86%
Κάλιο (K2O)	ολικό διαλυτό σε νερό	7%
Θειικός ανυδρίτης (SO3)	διαλυτός σε νερό	20%
Σίδηρος (Fe)	ολικός	2%
Άνθρακας Βιολογικής προέλευσης (C)		7,5%

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Η σειρά FERTILSOLE HUMUS είναι ειδικά κοκκώδη λιπάσματα με χουμικά και φουλβικά οξέα, και το Κάλιο προέρχεται από θειικό κάλιο.
- Είναι ρυθμιστές του PH του εδάφους
- Ιδανικά για καλλιέργειες ευαίσθητες στο χλώριο
- Εμπλουτισμένα με Ιχνοστοιχεία
- Φτωχά σε χλώριο



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΔΟΣΗ
Κηπευτικά	50-100 κιλά/στρ.
Βαμβάκι	20-30 κιλά/στρ.
Ανθοκομικά	50-80 κιλά/στρ.
Καλαμπόκι	25-40 κιλά/στρ.
Δημητριακά	20-25 κιλά/στρ.
Ελιά	60-90 κιλά/στρ.
Αμπέλι	60-80 κιλά/στρ.
Φρούτα	60-90 κιλά/στρ.
Εσπεριδοειδή	80-120 κιλά/στρ.
Ακτινίδιο	60-90 κιλά/στρ.
Πατάτα	60-80 κιλά/στρ.



SOLFERRO

ΚΟΚΚΩΔΕΣ ΛΙΠΑΣΜΑ ΜΕ ΣΙΔΗΡΟ
ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σίδηρος (Fe)	υδατοδιαλυτός	12%
Οξείδιο του Μαγνησίου (MgO)	συνολικό	5%
Οξείδιο του Μαγνησίου (MgO)	υδατοδιαλυτό	3%
Μαγγάνιο (Mn)	υδατοδιαλυτό	0,6%
Ψευδάργυρος (Zn)	υδατοδιαλυτός	0,1%
Τριοξείδιο του θείου (SO ₃)	υδατοδιαλυτό	34%



ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή περιεκτικότητα σε Σίδηρο (Fe) για αφομοίωση σε όξινες συνθήκες ώστε να αποφεύγεται η χλώρωση σιδήρου.
- Υψηλή περιεκτικότητα σε Μαγνήσιο (MgO) που επιτρέπει την αναπλήρωση του στο έδαφος, ώστε να ευνοείται η ανάπτυξη της καλλιέργειας.
- Υψηλή περιεκτικότητα σε Θείο (SO₃) που οδηγεί σε ορισμένη οξύνιση του εδάφους, ώστε να προλαμβάνονται καταστάσεις ελλείψεων.
- Υψηλή περιεκτικότητα σε Μαγγάνιο (Mn) και Ψευδάργυρο (Zn), ώστε να προλαμβάνονται ελλείψεις των εν λόγω ιχνοστοιχείων.
- Πολύ χαμηλή συγκέντρωση σε Χλώριο και Νάτριο, που διευκολύνει την ανάκτηση και δόθρωση των αλκαλικών και αλατούχων εδαφών.
- Αυξάνει τα αποθέματα του Μαγνησίου, Σιδήρου, Μαγγανίου και Ψευδαργύρου στο έδαφος, επιτρέποντας την εξοικονόμηση σημαντικών αποθεμάτων καθώς και από την χρήση πρόσθετων επεμβάσεων με ιχνοστοιχεία.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΔΟΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	ΔΟΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ
Σιτηρά	Ξηρική Αρδευόμενη	30-40 κιλά/στρ. 40-50 κιλά/στρ.	40-50 κιλά/στρ. 50-70 κιλά/στρ.
Δενδρώδεις καλλιέργειες	Ξηρική Αρδευόμενη	0,3-0,5 κιλό/δενδ. 0,3-1 κιλό/δενδ.	0,5-1 κιλό/δενδ. 1-2 κιλά/δενδ.
Αμπέλι	Ξηρική Αρδευόμενη	20-30 κιλά/στρ. 30-50 κιλά/στρ.	30-50 κιλά/στρ. 60-80 κιλά/στρ.
Κηπευτικά	Αρδευόμενη	40-100 κιλά/στρ.	50-200 κιλά/στρ.
Καλαμπόκι	Αρδευόμενη	50-70 κιλά/στρ.	70-90 κιλά/στρ.
Ρύζι	Αρδευόμενη	20-30 κιλά/στρ.	30-40 κιλά/στρ.
Ηλιάνθος	Ξηρική	30-50 κιλά/στρ.	50-70 κιλά/στρ.
Ζαχαρότευτλα	Αρδευόμενη	40-60 κιλά/στρ.	60-80 κιλά/στρ.
Πατάτα	Αρδευόμενη	50-100 κιλά/στρ.	60-150 κιλά/στρ.



HUMICRO

ΚΟΚΚΩΔΕΣ ΛΙΠΑΣΜΑ ΜΕ ΣΙΔΗΡΟ
ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σίδηρος (Fe)	υδατοδιαλυτός	8,4%
Οξειδίο του Μαγνησίου (MgO)	συνολικό	3,5%
Μαγγάνιο (Mn)	υδατοδιαλυτό	0,5%
Τριοξειδίο του θείου (SO ₃)	υδατοδιαλυτό	23%
Οργανική Ουσία		11%



ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Humicro χάρης στη σύνθεση του βελτιώνει την ανταλλαγή των κατιόντων, προλαμβάνει τις τροφopenίες σε ουσιώδη μικροστοιχεία.
- Πρωωθεί την ανάπτυξη της χρήσιμης μικροχλωρίδας.
- Περιορίζει την νιτροποίηση του αζώτου οπότε περιορίζει τις απώλειες.
- Έχει μια τάση να ισχυροποιεί τον φυτικό ιστό, οπότε μας προκύπτει ένα φυτό πιο υγιές.
- Βελτιώνει την γονιμότητα του εδάφους.
- Αυξάνει την αποτελεσματικότητα των λιπασμάτων με υψηλό ποσοστό φωσφόρου.
- Εμπλουτισμένο με χουμικά και φουλβικά οξέα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΔΟΣΗ
Δημητριακά	Κατά την σπορά ή κάλυψη Σε μίγμα με λιπάσματα	20-30 κιλά/στρ. 5-10 κιλά/στρ.
Δενδρώδεις καλλιέργειες	Χειμερινή λίπανση	30 κιλά/στρ.
Αμπέλι	Χειμερινή λίπανση Άνοιξη	20-5 κιλά/στρ. 20 κιλά/στρ.
Κηπευτικά	Θερμοκήπιο Υπαίθρια	100-200 κιλά/στρ. 50-100 κιλά/στρ.
Πατάτα	Βασική λίπανση	40-100 κιλά/στρ.
Ρύζι	Αρδεύομενη	20-30 κιλά/στρ.
Ηλιανθος	Ξηρική	30-50 κιλά/στρ.
Ζαχαρότευτλα	Αρδεύομενη	40-60 κιλά/στρ.



AGRISOL PLUS

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΜΕ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ AGRISOL PLUS

AGRISOL PLUS 8-24-24+TE	AGRISOL PLUS 20-20-20+TE
AGRISOL PLUS 9-18-27+TE	AGRISOL PLUS 21-7-7+TE
AGRISOL PLUS 15-5-30+2MgO	AGRISOL PLUS 22-5-22+TE



ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Έχουν μια αυξημένη αποτελεσματικότητα λόγω της καινοτόμου τεχνολογίας Multiple Effect.
- Οι συντελεστές που περιέχονται καρβοξυλικά οξέα, εκχυλίσματα φυκιών και οι βιοδιεγέρτες έχουν σημαντικό ρόλο για την απορρόφηση μακρο-και μικρο-στοιχείων, από το φυτό.
- Οι συντελεστές προώθησης βοηθούν το φυτό να διατηρήσει το δυναμικό σύστημα των ριζών του.
- Η σειρά AGRISOL PLUS αποτελείται από διάφορες αναλογίες NPK για να καλύψει κάθε απαίτηση σε όλα τα στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας.
- AGRISOL PLUS είναι πολύ διαλυτά στο νερό, αυτό σημαίνει ότι μόλις βρίσκονται στο έδαφος μπορούν να απορροφούνται ταχύτερα σε σχέση με τα συνήθη τυπικά λιπάσματα.
- Επειδή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά οι δόσεις εφαρμογής του AGRISOL PLUS μπορούν να μειωθούν κατά 20-30% από τα αντίστοιχες σύνθεσης λιπάσματα, που αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνετε ο κίνδυνος ρύπανσης των υπόγειων υδάτων.
- Τα οφέλη του AGRISOL PLUS είναι πιο εμφανή στα ασβεστολιθικά εδάφη ή στο έδαφος που χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο E.C.
- Η σειρά των AGRISOL PLUS είναι φτωχή σε Χλωριούχα και Βαρέα Μέταλλα, σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΔΟΣΗ
Κηπευτικά	20-40 κιλά/στρ.
Φράουλα	40-60 κιλά/στρ.
Εσπεριδοειδή, Οπωροφόρα, Ελιά, Αμπέλι	30-60 κιλά/στρ.
Ανθοκομικά	60-80 κιλά/στρ.

TE (EDTA): 0,01%B ,0,02%Cu, 0,05%Fe, 0,05%Mn, 0,002%Mo, 0,005%Zn

Η κλίμακα PH που εγγυάται καλή σταθερότητα των χηλικών στοιχείων είναι: 4 έως 9.



AGRIVITA 0-0-51

ΘΕΙΙΚΟ ΚΑΛΙΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ (S 47)
ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΚΑΛΙΟ (K2O)	υδατοδιαλυτό	51%
ΘΕΙΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ (SO3)	υδατοδιαλυτό	47%

ΤΥΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ	ΔΟΣΗ
Μηλοειδή	4	3,5-9 κιλά /στρ.
Πυρηνόκαρπα	4	5,5-14 κιλά/στρ.
Εσπεριδοειδή	5	7-13 κιλά/στρ.
Αμπέλι επιτρ.	4	8-22 κιλά/στρ.
Αμπέλι οινοπ.	5	2-5 κιλά/στρ.
Ακτινίδιο	5	8-12 κιλά/στρ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ	ΔΟΣΗ
Καρποφόρα δένδρα	3-5	0,7-1,4 κιλά /στρ.
Ελιά	3	1,0-1,5 κιλά/στρ.
Πατάτα	2-3	0,8-1,2 κιλά/στρ.
Κρεμμύδι, Καρότο	3	1,0-1,5 κιλά/στρ.



AGRIVITA 13-0-46

ΝΙΤΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ
ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Άζωτο (N)	υδατοδιαλυτό	13%
Άζωτο Νιτρικό (N-NO3)	υδατοδιαλυτό	13%
Κάλιο (K2O)	υδατοδιαλυτό	46%

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το ΝΙΤΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ είναι ένα πλήρως υδατοδιαλυτό λίπασμα για όλες τις απαιτητικές καλλιέργειες.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ	ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ
Εσπεριδοειδή	1-3 ψεκασμοί με διάλυμα 2%	20-30 kg/στρ. σε 3-7 δόσεις
Κηπευτικά, Φράουλα	Με διάλυμα 1-2%	30-60 kg/στρ. σε 3-4 δόσεις
Βαμβάκι	3-4 ψεκασμοί με διάλυμα 3-5%	15 kg/στρ. σε 2-3 δόσεις
Πατάτα	Με διάλυμα 1-2%	
Οπωροφόρα, Αμπέλι	2-5 ψεκασμοί με διάλυμα 0,5-1%	15-20 kg/στρ. σε 2-5 δόσεις
Ελιά	2-3 ψεκασμοί με διάλυμα 2-4%	



AGRIVITA CALCIO

ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ GG
ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Άζωτο (N)	Ολικό	15,2%
Άζωτο Νιτρικό (N-NO ₃)		14%
Άζωτο Αμμωνιακό (N-NH ₄)		1,2%
Οξείδιο ασβεστίου (CaO)	υδατοδιαλυτό	26,6%

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


Το ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ GG είναι ένα πλήρως υδατοδιαλυτό λίπασμα για όλες τις απαιτητικές καλλιέργειες σε ασβεστό.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ	ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ
Εσπεριδοειδή	0,5-1 kg/δένδρο	0,4-0,8 kg/δένδρο σε 3-4 δόσεις
Βερίκοκο	0,5-0,8 kg/δένδρο	0,4 kg/δένδρο
Κηπευτικά, Φράουλα	Με διάλυμα 1-2%	30-60 kg/στρ. σε 3-4 δόσεις
Βαμβάκι	Με διάλυμα 3-5%	15 kg/στρ. σε 2-3 δόσεις
Πατάτα	Με διάλυμα 1-2%	
Οπωροφόρα, Αμπέλι, Ακτινίδιο	Με διάλυμα 0,5-1%	15-20 kg/στρ. σε 2-5 δόσεις
Ελιά	0,5-0,8 kg/δένδρο	0,5 kg/δένδρο

Δόση και σύσταση: Κηπευτικές καλλιέργειες (τομάτα, κρεμμύδι, φράουλα, πιπεριά, καρότο, πατάτα κ.ά) και ειδικές (αμπέλι, μήλο, κεράσι, ροδάκινο, βερίκοκο κ.ά): 3-5 κιλά/1000 λίτρα νερού.



AGRIVITA FUR

ΦΩΣΦΟΡΙΚΗ ΟΥΡΙΑ / 18-44-0
ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Άζωτο (N)	18%
Άζωτο Ουρεϊκό	18%
Φώσφορος (P205)	44%

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

100% διαλυτή σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο και νερό.

Η ΦΩΣΦΟΡΙΚΗ ΟΥΡΙΑ είναι ένα πλήρως υδατοδιαλυτό λίπασμα για όλες τις απαιτητικές καλλιέργειες.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ		
	Συγκέντρωση	Γραμ./λίτρο	Κιλά/στρ
Υδρολίπανση (θερμοκήπια, υπαίθριες καλλιέργειες)	0,01-0,05	0,1-0,5 ή 100-500 gr/T	
Εντοπισμένη εφαρμογή με σπορέα			5
Διαφυλλικά	0,1-0,3	1-3 ή 1-3 kg/T	



AGRIVITA MAP

**ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΜΟΝΟΑΜΜΩΝΙΟ / 12-61-0
ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ**

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αζωτο (N)	12%
Αζωτο Αμμωνιακό (N-NH ₄)	12%
Φώσφορος (P2O5)	61%

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

100% διαλυτό σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο και νερό.

Το ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΜΟΝΟΑΜΜΩΝΙΟ είναι ένα πλήρως υδατο-διαλυτό λίπασμα για όλες τις απαιτητικές καλλιέργειες.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ	ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ
Δενδρώδεις	2-4%	100-400 gr/δένδρο
Αμπέλι	1-2%	4-5 kg/στρ.
Κηπευτικά	1-3%	1,5-2 kg/στρ



AGRIVITA MKP

ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΜΟΝΟΚΑΛΙΟ / 0-52-34
ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Φώσφορος (P2O5)	υδατοδιαλυτός	52%
Κάλιο (K2O)	υδατοδιαλυτό	34%

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

100% διαλυτό σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο και νερό.

Το ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΜΟΝΟΚΑΛΙΟ είναι ένα πλήρως υδατοδιαλυτό λίπασμα για όλες τις απαιτητικές καλλιέργειες.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ	ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ
Εσπεριδοειδή	1-3 ψεκασμοί με διάλυμα 2-5%	400-600γρ./δένδρο σε 2-3 δόσεις
Κηπευτικά	1-3 ψεκασμοί με διάλυμα 0,5-3%	0,5-1kg/m3 νερού (2-4kg/στρ.)
Βαμβάκι	3-4 ψεκασμοί με διάλυμα 3-4%	1,5-2 kg/στρ. σε 2-3 δόσεις
Πατάτα	2-4 ψεκασμοί με διάλυμα 1-3%	4-6 kg/στρ. σε 1-3 δόσεις
Οπωροφόρα	2-4 ψεκασμοί με διάλυμα 1-2%	400-600γρ./δένδρο σε 2-3 δόσεις
Αμπέλι	2-4 ψεκασμοί με διάλυμα 1-2%	10-15kg/στρ. σε 2-3 δόσεις



AGRIVITA NPK WS PLUS

ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ
ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ

ΤΥΠΟΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ AGRIVITA NPK WS

AGRIVITA NPK WS PLUS 12-8-14+10%CaO

AGRIVITA NPK WS PLUS 15-5-30+2%MgO

AGRIVITA NPK WS PLUS 13-40-13+TE

AGRIVITA NPK WS PLUS 20-20-20+TE

AGRIVITA NPK WS PLUS 16-13-26+3%MgO+TE

AGRIVITA NPK WS PLUS 30-10-10+TE

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Η σειρά AGRIVITA NPK WS είναι πλήρως υδατοδιαλυτά λιπάσματα εμπλουτισμένα με ιχνοστοιχεία.

TE (EDTA): 0,03%B, 0,03%Cu, 0,1%Fe, 0,07%Mn, 0,005%Mo, 0,1%Zn.

Η κλίμακα PH που εγγυάται καλή σταθερότητα των χηλικών στοιχείων είναι: 4 έως 8.

Η δοσολογία και ο αριθμός εφαρμογών εξαρτώνται από την καλλιέργεια, το στάδιο ανάπτυξης και συνιστάται συμβουλευτική οδηγία από γεωτεχνικό.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΔΟΣΗ
Κηπευτικά υπό κάλυψη	Παρέμβαση στο στάδιο της γονιμοποίησης	2,5-3,5 κιλά /στρ.
Κηπευτικά υπαίθρια		2,5-4 κιλά/στρ.
Φράουλα		2-3 κιλά/στρ.
Πατάτα	Καθόλη τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου	2-4,5 κιλά/στρ.
Δενδρώδεις καλλιέργειες	Παρέμβαση στο στάδιο της γονιμοποίησης	10-20 κιλά/στρ.
Αμπέλι		3,5-4,5 κιλά/στρ.
Φυτώρια		2-5 κιλά/στρ. 1-2 γρ./γλάστρα



AGRIVITA

ΜΙΓΜΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Βόριο (B)	υδατοδιαλυτό	0.5%
Χαλκός (Cu) EDTA	υδατοδιαλυτός	0,5%
Σίδηρος (Fe) EDTA	υδατοδιαλυτός	7%
Μαγγάνιο (Mn) EDTA	υδατοδιαλυτό	2%
Μολυβδαίνιο (Mo)	υδατοδιαλυτό	0,5%
Ψευδάργυρος (Zn) EDTA	υδατοδιαλυτός	0,5%

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Είναι ένα υδατοδιαλυτό μείγμα ιχνοστοιχείων σε στερεό παρασκεύασμα.

Είναι κατάλληλο να διορθώνει και να προλαμβάνει ελλείψεις των παραπάνω ιχνοστοιχείων, με μια καλή ισορροπία των ιχνοστοιχείων που μπορούν να κάνουν μια ορθολογική θρέψη. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε υδροπονική καλλιέργεια.

PH 6.5 - 7.5.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΜΙΓΜΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ για όλες τις καλλιέργειες και απορροφάτε γρήγορα από τα φυτά μέσω των φύλλων και των ριζών.

Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την καλλιεργητική περίοδο της καλλιέργειας συνιστώντας 4-6 εφαρμογές των 100g / 100 λίτρα νερού διαφυλλικά και εφαρμογή 1-1,3 kg / στρ. μέσω του ριζοποτίσματος.



FOGLIARE

ΝΡΚ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ

ΤΥΠΟΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ FOGLIARE

FOGLIARE 10-5-30+TE	FOGLIARE 28-8-8+TE
FOGLIARE 12-36-12+TE	FOGLIARE 18-18-18+TE



ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Η σειρά FOGLIARE είναι μια σειρά N-P-K πλήρως υδατοδιαλυτά λιπάσματα που είναι εμπλουτισμένα με εκχυλίσματα φυκιών, καρβοξυλικά οξέα, βιοδιεγέρτες και προσκολλητική ουσία για γρήγορη απορρόφηση από τα φύλλα.
- Αυξάνει την αντοχή στο στρες.
- Είναι ρυθμιστής αγωγιμότητας.
- Ενισχύει τους μηχανισμούς αυτοάμυνας των φυτών.
- Ιδανικό για την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, της βλάστησης, ενώ συμβάλλει στην καρπώδεση και ωρίμανση των καρπών.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθόλη την διάρκεια του βιολογικού κύκλου του φυτού με διαφυλλικές εφαρμογές που είναι συμπλήρωμα της εδαφικής λίπανσης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΔΟΣΗ - ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ
Κηπευτικά υπό κάλυψη – υπαίθρια, φυλλώδη λαχανικά	150-200 γρ./100 κιλά νερό
Καλλωπιστικά	150-250 γρ./100 κιλά νερό
Φρούτα, Εσπεριδοειδή, Ελιά, Αμπέλι	200-300 γρ./100 κιλά νερό

TE (EDTA): 0,02%B , 0,05%Mn, 0,005%Mo, 0,05%Zn

Η κλίμακα PH που εγγυάται καλή σταθερότητα των χηλικών στοιχείων είναι: 4 έως 9.



MAXYFLOR

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αμινοξέα	ολικά	50%
Αμινοξέα	ελεύθερα	35%
Βαθμός υδρόλυσης		40%



ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Προϊόν ενζυματικής υδρόλυσης (Fabaceae).
- Βοηθάει στην καλή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος.
- Συντελεί εξαιρετικά στην αντοχή του φυτού σε καταστάσεις στρες, παγετούς, ξηρασία, ζιζάνια, χαλαζόπτωση κ.λπ.
- Βελτιώνει την ικανότητα φωτοσύνθεσης με αποτέλεσμα να έχουμε φρούτα και λαχανικά υψηλής θρεπτικής αξίας.
- Σε συνδυασμό με προγράμματα φυτοπροστασίας βελτιώνει την αποτελεσματικότητά του, διεγείρει την αυτοάμυνα του φυτού και την χρήσιμη μικροχλωρίδα της ρίζας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ	ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ
Κηπευτικά	250–300 g/100 lt νερού	1–3 kg/στρ
Δενδρώδεις καλλιέργειες	0,5–1 kg/στρ	1–2 kg/στρ
Αμπέλι	0,3–0,5 kg/στρ	1–2 kg/στρ
Σιτηρά	0,2–0,5 kg/στρ	

Το MAXYFLOR χρησιμοποιείται σ' όλο τον φυτικό κύκλο τόσο ως διαφυλλικά όσο και από το ριζικό σύστημα. Οι δοσολογίες εξαρτώνται από τη γονιμότητα του εδάφους, από τις απαιτήσεις της καλλιέργειας κλπ.



LIQUID HUMUS

ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οργανική ουσία ως έχει	27%
Οργανική ουσία σε ξηρά ύλη	78%
Η οργανική ύλη υγραίνεται σε ποσοστό επί ξηράς ουσίας	81%
Οργανικό άζωτο (N) επί ξηράς ουσίας	0,4%
Αναλογία C / N	97,5%

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το υγρό Humus® είναι ένα εκκυλισμένο υγρό σκεύασμα από ουσίες με υψηλή περιεκτικότητα σε χουμικά, αυξάνοντας την αναδιάρθρωση του εδάφους, χρησιμεύοντας στη βελτίωση των φυσικών, χημικών και βιολογικών χαρακτηριστικών του εδάφους.

Το Liquid Humus® στην πραγματικότητα αυξάνει την ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων (CSC) μειώνοντας τις απώλειες έκπλυσης των σημαντικών θρεπτικών στοιχείων, προωθεί τη διήθηση του οξυγόνου στο έδαφος που είναι δύσκολο σε αργιλώδη εδάφη ή υποκείμενα στη στασιμότητα του νερού. Η συγκεκριμένη διαδικασία εκκύλισης παράγει υγρές Ουσίες Humus® όπως υδατάνθρακες, οι οποίες έχουν μια άμεση δράση στην ανάπτυξη του φυτού και στην ριζοβολία και είναι εξαιρετικό υπόστρωμα για ανάπτυξη της μικροχλωρίδας πώς mycorrhizae, κ.λ.π.

Οι ουσίες που περιέχονται στο Liquid Humus® μειώνουν την επίδραση του νατρίου στο ρίζα, αυξάνουν την αποτελεσματικότητα του αζώτου και ευνοούν την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Οι δόσεις εξαρτώνται από τη γονιμότητα του εδάφους και από την καλλιέργεια, που κυμαίνεται από 1-3 κιλά / στρ, για υδρολίπανση και 400-600 γρ. / 100 λίτρα για εφαρμογές διαφυλλικά.



FERTALIQ CAMA

8-0-0+8CaO+2MgO
ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Άζωτο (N)	ολικό	8%
Άζωτο (N)	νιτρικό	8%
Οξειδίο του Ασβεστίου (CaO)	υδατοδιαλυτό	8%
Οξειδίο του Μαγνησίου (MgO)	υδατοδιαλυτό	2%



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

FERTALIQ CAMA είναι ένα διάλυμα νιτρικού ασβεστίου που περιέχει και Μαγνήσιο για την πρόληψη και διόρθωση τροφοπενιών ασβεστίου και Μαγνησίου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Οι δοσολογίες εξαρτώνται από το είδος της καλλιέργειας και της γονιμότητας του εδάφους.

Γενικά για υδρολίπανση προτείνεται: 3-5 κιλά/στρ.

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Αναζωογονεί το έδαφος, προστατεύει τη ρίζα.
- ✓ Αποφυγή ξήρανσης του βλαστού της αμπέλου.
- ✓ Συμβάλλει στην αποφυγή σήψης της ντομάτας.
- ✓ Προλαμβάνει την φυσιολογική ξηρότητας του πεπονιού.
- ✓ Βοηθάει στη αποφυγή της εσωτερικής κηλιδώσης του μούρου της πιπεριάς.



WHITEFER

ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χαλκός (Cu)	υδατοδιαλυτός	0,8%
Σίδηρος (Fe)	υδατοδιαλυτός	13,5%
Οξείδιο του Μαγνησίου (MgO)	υδατοδιαλυτό	2%
Τριοξείδιο του θείου(SO3)	υδατοδιαλυτό	9%



ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Το WHITE FER είναι φυσικό προϊόν φόρμουλα τέτοια που το καθιστά πολύ εύκολο στην διασπορά του σιδήρου με την προσθήκη του Μαγνησίου του Χαλκού και του Θείου ώστε να εγγυηθεί μια διαφορετική καινοτομία όπου απορροφάτε καλύτερα ο σίδηρος οπότε προλαβαίνετε η έλλειψη και η διόρθωση σιδήρου.
- Συνέργεια μεταξύ της προστασίας από το ιόν Fe και της βιολογικής δράσης που διεξάγεται σε επίπεδο αγρού και ριζικού συστήματος
- Διαφοροποιημένο από τα συνήθη Χημικά Σιδήρου (με ιόν Fe 3+), το WHITE FER απορροφάτε σε μορφή πολύ πιο γρήγορα και αποτελεσματική (Fe 2+) και σε οργανική μορφή στο εσωτερικό του φυτού, ως συστατικό της φεριτίνης.
- Άσπρο χρώμα** που το καθιστά μοναδικό στο είδος του και διαφορετικό από άλλα συνήθη προϊόντα για την αντιμετώπιση της έλλειψης σιδήρου.
- Δεν διασπάται ούτε σε δύσκολα PH ούτε σε αλατότητα βοηθάει στην ανάπτυξη της χλωρίδας, αυξάνει την μικροβιακή χλωρίδα, και την δράση του ενζύματος Ferro-reductasi.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΡΙΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2-3 εφαρμογές	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Δέντρα, Ελιά	0,7-1 Kg/στρ.	2-3 Kg/στρ.
Φρούτα, Σταφύλι	0,3-0,5 Kg/στρ.	1-1,5 Kg/στρ.
Φράουλα	0,5-0,8 Kg/στρ.	1,5-2,5 Kg/στρ.
Ντομάτα, Πιπέρια	0,5-0,7 Kg/στρ.	1,5-2 Kg/στρ.
Μελιτζάνα	0,5-0,7 Kg/στρ.	1,5-2 Kg/στρ.
Καρπούζι, Πεπόνι	0,5-0,7 Kg/στρ.	1,5-2 Kg/στρ.
Αγγούρι, Κολοκύθι	0,5-0,7 Kg/στρ.	1,5-2 Kg/στρ.
Σκόρδο, Κρεμμύδι	0,3-0,5 Kg/στρ.	1-1,5 Kg/στρ.
Μαρούλι	0,5-0,7 Kg/στρ.	1,5-2 Kg/στρ.
Αγκινάρα	0,7-1 Kg/στρ.	2-3 Kg/στρ.
Διακοσμητικά	0,4-0,7 Kg/στρ.	1,5-2,5 Kg/στρ.



NAUTILUS

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Περιεκτικότητα σε Μυκόρριζες 0,0001%

Περιεκτικότητα σε Βακτήρια Ριζόσφαιρας 1×10^9 UFC/gr

Το προϊόν δεν περιέχει γενετικά τροποποιημένους και παθογενείς οργανισμούς (Σαλμονέλα, κολοβακτηρίδια, με-σόφιλα βακτήρια, αερόβια βακτήρια και αυγά νηματωδών).

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Είναι ένα προϊόν φυσικής προέλευσης σε υγρή μορφή, που συνδέει επιλεγμένα στελέχη μυκήτων μυκόρριζων με βακτήρια της ριζόσφαιρας που υπάρχουν στη φύση.
- Περιέχει σπόρους βακίλου Subtilis, ένα βακτήριο που είναι σε θέση να αντιμετωπίσει διάφορες ανωμαλίες από προσβολές σε συνδυασμό με προγράμματα φυτοπροστασίας όπως είναι ο Βοτρύτης, Ριζidio, σκληρωτία, Alternaria, Penicillium, ασθένειες εδάφους και διάφορες άλλες μυκητολογικές προσβολές.
- Εφαρμογή στο έδαφος συνεισφέρει σε μια ιδανική υγιή κατάσταση για τα φυτά.
- Η εφαρμογή του NAUTILUS κανονικά δια μέσω του φυλλώματος ή ριζοποτίσματος, προκαλεί μια πράξη βιοδιέγερσης των φυτικών ιστών, ώστε να τους κάνει πιο ανθεκτικούς και να αντιδρούν σε συγκεκριμένες καταστάσεις στρες βιοτικής, ή αβιοτικής προέλευσης.
- Αποικοδόμηση της οργανικής ουσίας και αυξάνει την διαλυτοποίηση Φωσφόρου, Σιδήρου κ.ά. στο έδαφος.
- Παρέχει ένζυμα και αυξίνες.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οπωροκρηπυτικά θερμοκηπίου ή σε υποδομή με κάλυψη αλλά και σε ανοιχτό αγρό, Φράουλα

ΡΙΖΑ: 200 κ.εκ./100 λίτρα + Multiaction Myco 2-3 λίτρα/στρ. **ΕΦΑΡΜΟΓΗ:** Εμβάπτιση των ριζών πριν τη φύτευση ή διαβροχή-εμβάπτιση των κυψελωδών κύβων τύρφης για αρκετά λεπτά

ΡΙΖΑ: 200 κ.εκ./100 λίτρα + Multiaction Myco 2-3 λίτρα/στρ. **ΕΦΑΡΜΟΓΗ:** Κάνετε 3-5 επεμβάσεις με υδρολίπανση σύμφωνα με τον κύκλο διανέμεντας το προϊόν με υδρολίπανση.

ΦΥΛΛΟ: 200 κ.εκ./100 λίτρα + Multiaction Myco 200-250 κ.εκ./100 λίτρα. **ΕΦΑΡΜΟΓΗ:** Κάντε 3-4 διαφυλλικούς ψεκασμούς ξεκινώντας από τη φάση της προ άνθισης έως την συγκομιδή.

Φάρμες φρούτων, Διακοσμητικά

ΡΙΖΑ: 200 κ.εκ./100 λίτρα + Multiaction Myco 2-3 λίτρα/στρ. **ΕΦΑΡΜΟΓΗ:** Στη υδρολίπανση. Κατά τον κύκλο παραγωγής, από 2-3 επεμβάσεις.

ΦΥΛΛΟ: 200 - 250 κ.εκ./στρ. + Multiaction Myco 150-200 κ.εκ./100 λίτρα. **ΕΦΑΡΜΟΓΗ:** Κάντε 3-4 διαφυλλικούς ψεκασμούς ξεκινώντας από τη φάση της καρπόδεσης κατά τη φάση της προ συγκομιδής.

Σταφύλια

ΦΥΛΛΟ: 120-150 κ.εκ./στρ. + Multiaction Myco 300-400 κ.εκ./στρ. **ΕΦΑΡΜΟΓΗ:** Κάντε 3-4 διαφυλλικούς ψεκασμούς από το τέλος της άνθισης έως την προ συγκομιδή.

Δημητριακά

ΦΥΛΛΟ: 100 κ.εκ./στρ + Multiaction Myco 2-4 λίτρα/στρ. **ΕΦΑΡΜΟΓΗ:** Ψεκασμός στη φάση που το φύλλο είναι μεγάλο σαν σημαία.

Γκαζόν

ΦΥΛΛΟ: 300 κ.εκ./στρ. + Multiaction Myco 2-3 λίτρα/στρ. **ΕΦΑΡΜΟΓΗ:** Κάντε 1-2 επεμβάσεις με μπάρα ψεκασμού στο τέλος του καλοκαιριού πριν την αισθητή πτώση των θερμοκρασιών.

Προσυλλεκτική & μετασυλλεκτική μεταχείριση καρπών

ΦΥΛΛΟ: Προσυλλεκτικά, 1-2 εφαρμογές, 15 ημέρες ή/και 1 εβδομάδα πριν τη συγκομιδή, 100 κ.εκ./στρ. **ΕΦΑΡΜΟΓΗ:** Μετασυλλεκτικά, Διαβροχή 1 εφαρμογή, 400 κ.εκ./ 20 λτ. νερού για 1.000 kgρ καρπούς.

NEMO PLUS

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

NEMO PLUS, είναι ένα νέο υγρό σκεύασμα που βασίζεται σε φυσικά συστατικά φυτικής προέλευσης. Εφαρμόζεται τακτικά, ξεκινώντας από τη φάση της μεταφύτευσης και τις περιόδους μεγαλύτερης ευπάθειας στις προσβολές νηματωδών, πραγματοποιεί μια δράση ανάπτυξης φυτο-οχύρωσης του ριζικού συστήματος, προωθώντας την ανανέωσή της και τη μεγαλύτερη λειτουργικότητα. Όλα αυτά επιφέρουν μεγαλύτερη αντίσταση στις προσβολές, μεγαλύτερη σφριγνλότητα της φυτικής-παραγωγικής απόκρισης του φυτού, η οποία υλοποιείται με πιο ισχυρό, δυνατό περιβάλλον και υψηλότερες παραγωγές από ποσοτική και ποιοτική άποψη.



ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μεγαλύτερη αντοχή των φυτών στις βλάβες που προκαλούνται από το βιοτικό και αβιοτικό στρες.
- Βελτιώνει τις συνθήκες του εδάφους, αυξάνοντας τη διαπερατότητά του και συμβάλλοντας στην απομάκρυνση των στοιχείων που προκαλούν αύξηση της αλατότητας.
- Προωθεί την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και την ανάπτυξη χρήσιμης μικροχλωρίδας.
- Διατηρεί το φύλλο ανθεκτικό στις μηχανικές καταπονήσεις.
- Περιέχει αμινοξέα 5% και ascorphyllum

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΣΚΟΠΟΣ	ΤΡΟΠΟΙ	ΔΟΣΗ
Κηπευτικά	Σε στρατηγική με φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ως ενισχυτικό για το ριζικό σύστημα.	Υδρολίπανση	300-500 gr/στρ.
	Στην εμφάνιση βιοτικών ή αβιοτικών καταστάσεων στρες.	Διαφυλλικά (Spray)	200-300 gr/στρ.
Αμπέλια (Επιτραπέζια Οиноποιήσιμα)	Σε στρατηγική με φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ως ενισχυτικό για το ριζικό σύστημα.	Υδρολίπανση	300-500 gr/στρ.
	Στην εμφάνιση βιοτικών ή αβιοτικών καταστάσεων στρες.	Διαφυλλικά (Spray)	200-300 gr/στρ.
Ανθοκομία	Σε στρατηγική με φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ως ενισχυτικό για το ριζικό σύστημα.	Υδρολίπανση	300-500 gr/στρ
Εσπεριδοειδή Οπωροφόρα Ελιά	Στην εμφάνιση βιοτικών ή αβιοτικών καταστάσεων στρες. Σε εφαρμογές φυτοπροστατευτικών και προϊόντων θρέψης μειώνει την επιφανειακή τάση των διαλυμάτων.	Διαφυλλικά (Spray)	250-400 gr/100 λίτρα εγγυάται μία ποσότητα 300-500 gr/στρ. 50 κ.εκ./100 λίτρα στο διάλυμα που πρόκειται να ψεкаστεί



NEMASIR NEW

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Περιεκτικότητα σε Μυκόρριζες	0,0001%
Περιεκτικότητα σε Βακτήρια ρίζας	0,0001%

Το προϊόν δεν περιέχει οργανισμούς γενετικά τροποποιημένους, ούτε παθογενείς (σαλμονέλα, κολοβακτηρίδια, Μεσόφιλα αερόβια και συγά νηματοδών).



ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **NEMASIR NEW** είναι ένα φυσικό προϊόν σε υγρή μορφή προερχόμενο από συνδυασμό δυο επιλεγμένων στελεχών μυκήτων των **ROCHONIA** και **ARTHROBOTRYS** που υπάρχουν στη φύση μολισμένα στον αγρό προσδίδουν ανάπτυξη και αποκατάσταση της θρέψης των φυτών.
- **NEMASIR NEW** συνεισφέρει στην ανταλλαγή θρεπτικών ουσιών και γενικά όλες τις φυσικές διεργασίες έτσι ώστε να μη δυσκολεύεται από καταστάσεις stress που προκαλούνται από αβιοτικούς παράγοντες.
- **NEMASIR NEW** μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με προγράμματα φυτοπροστασίας για τους νηματοδείς.

Το προϊόν βοηθάει από συνέργειες μέσω εφαρμογής του **Multi-action Myco**, που ενεργοποιεί τη δράση, Θεωρείται σκόνη να γίνει ένα μίγμα των δυο προϊόντων μέσα σε λίγο νερό αφήνοντας τα να δράσουν για 3-4 ώρες πριν τη διανομή.

Συνιστάται η χρήση σε συνδυασμό με προϊόντα νηματοδοκτόνα με τα οποία είναι συμβατά και μπορεί να συνδυαστεί.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ
Οπωροκρηπυτικά σε θερμοκήπιο και υπαίθρια.	Διάβρεξη ριζών πριν το φύτευμα ή διάβρεξη των κύβων της τύρφης.	200-300 κ.εκ./100 λίτρα + Multiaction Myco 200 κ.εκ./100 λίτρα
Οπωροκρηπυτικά σε θερμοκήπιο ή σε υποδομή προστασίας και υπαίθρια.	Πρώτη επέμβαση σε υδρολίπανση στη μεταφύτευση ή στη ή σπορά. Ακολούθως να γίνουν 2-3 επεμβάσεις στη υδρολίπανση.	200 κ.εκ./στρ. + Multiaction Myco 500 κ.εκ./στρ.
Οπωροκρηπυτικά	Σε περίπτωση χρήσης εξοπλισμού ψεκασμού τότε πρέπει να ακολουθηθεί πότισμα 8 mm για να μπορέσει το διάλυμα να εισχωρήσει στο έδαφος.	200 κ.εκ./στρ. + Multiaction Myco 500 κ.εκ./στρ.
Φάρμες φρούτων	Στην υδρολίπανση κατά τον κύκλο παραγωγής από 2-3 επεμβάσεις.	200 κ.εκ./στρ. + Multiaction Myco 500 κ.εκ./στρ.
Αμπέλια	Στην υδρολίπανση στη μεταφύτευση μετά από 2-3 επεμβάσεις κάθε 12-14 μέρες όταν υπάρχει ανάγκη.	100 κ.εκ./στρ. + Multiaction Myco 500 κ.εκ./στρ.
Φυτόρια υπαίθρια	Εφαρμογή στην περιοχή των ριζών. Στην υδρολίπανση από 3-5 επεμβάσεις από τη μεταφύτευση. Πραγματοποιώντας τις πρώτες δυο με διάστημα 8-10 ημερών και τ' άλλα κάθε 14 μέρες.	200 κ.εκ./100 λίτρα + Multiaction Myco 200 κ.εκ./100 λίτρα 300 κ.εκ./στρ. + Multiaction Myco 500 κ.εκ./στρ.
Γκαζόν	Μετά τη σπορά κάντε μια υδρολίπανση με μια καλή ποσότητα νερού (5 χιλιοστών).	200 κ.εκ./στρ. + Multiaction Myco 500 κ.εκ./στρ.

RUSTOP

ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το RUSTOP είναι ένα βιοδιεγέρτης φυσικής προέλευσης, σχεδιασμένος για εφαρμογή σε εκτατικές καλλιέργειες. Περιέχει σπόρια *Bacillus subtilis* και *Bacillus pumilis*, βακτήρια ικανά να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και την άριστη υγεία των φυτών.



ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Το RUSTOP συμβάλλει στην υγιή ανάπτυξη των φυτών, επιπλέον από τις διεργασίες ζύμωσης των δύο ενζύμων βακτηριδίων με βιοδιεγερτική δράση για το φυτό και αναπτύσσονται καρβοξυλικά οξέα με χηλική δράση των στοιχείων που υπάρχουν στο χώμα, αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα φωσφόρου και σιδήρου για το φυτό.
- Αντοχή στις αβιοτικές καταπονήσεις, υποστήριξη της υγείας των φυτών.
- Αυξημένη διαθεσιμότητα φωσφόρου για το φυτό.
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των επεξεργασμένων τροφίμων.
- Μεγαλύτερη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ	ΔΟΣΗ
Επεξεργασία σπόρων σιτηρών, Κριθάρι		2 λίτρα ανά τόνο σπόρων
Κατεργασία σπόρων καλαμποκιού, βαμβακιού και πατάτας	Επεξεργαστείτε τους σπόρους και στεγνώστε	3-5 λίτρα ανά τόνο σπόρων
Ελαιόδεντρα, Οπωρώνες	Εφαρμογή στο έδαφος στη βάση του κορμού	100 κ.εκ. ανά στρ.
Δημητριακά, όσπρια, βαμβάκι, πατάτες, καπνός	Διαφυλλική εφαρμογή	70 κ.εκ. ανά στρ.



MATA FLY

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Βελτιωτικό φυτικής προέλευσης όχι κομποστοποίησης. Περιεκτικότητα σε Μυκόρριζες: 0,0001%. Περιεκτικότητα σε Βακτήρια Ριζόσφαιρας: 1X10⁹ UFC/gr. Φυσικής προέλευσης με μυκόρριζες και βακτήρια. Περιέχει σπόρους *B. Subtilis*




ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Το προϊόν δεν περιέχει οργανισμούς γενετικά τροποποιημένους και παθογόνους οργανισμούς (σαλμονέλα, κολοβακτηρίδια κοπράνων, αερόβια μεσόφιλα και αυγά νηματοδών).
- Το MATA FLY είναι ένα προϊόν που περιέχει επιλεγμένα βακτήρια ριζόσφαιρας στελέχη Μυκήτων της Beauveria και Metarhizium σε μία συγκέντρωση 10⁹.
- Τέτοιοι μικροοργανισμοί συμβάλλουν στην ενεργή διατήρηση της μικροβιακής χλωρίδας, χρήσιμης, ικανής να δημιουργήσει συμβίωση με το φυτό και να εμποδίζει την ανάπτυξη του φυτοφάγου είδους. Το MATA FLY προσκολλάται στα ξυλώδη μέρη του φυτού και στη βλάστηση, επιτρέποντας τον πολλαπλασιασμό των ειδών μυκήτων που περιέχονται.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Εσπεριδοειδή Ελιά Οπωρώνες	100-150 κ.εκ./100 λίτρα + 200 κ.εκ. MYCO PRO. Δόση συντήρησης 150 κ.εκ./στρ.	Εφαρμογές πριν από τη ωρίμανση, ή μετά την τοποθέτηση των παγίδων για την παρακολούθηση, για τη σύλληψη των πρώτων ενήλικων εντόμων.
Μεγάλες Καλλιέργειες Καλαμπόκι Ρεβίθια, σόγια, Ηλιανθος κλπ.	70 κ.εκ./100 λίτρα + 100 κ.εκ. MYCO PRO	
Αμπέλι, Φρούτα	200 κ.εκ./στρ. + 300 κ.εκ./στρ. MYCO PRO	Συνδυασμένες εβδομαδιαίες εφαρμογές με προγράμματα φυτοπροστασίας κατά του <i>drosophila</i> και <i>κοκκοειδή</i>
Παλαμοειδή, Διακοσμικά φυτά	200 κ.εκ./100 λίτρα + 200 κ.εκ. MYCO PRO	Αποτελεσματικά σε εβδομαδιαία βάση.



HUMOSPRINT Ca

ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ

ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οξείδιο του Ασβεστίου (CaO) υδατοδιαλυτός 15%



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

HUMOSPRINT Ca είναι ένα λίπασμα υγρό σχεδιασμένο για να παρέχει ασβέστιο βιολογικής προέλευσης και εξαιρετικά βιοδιαθέσιμο.

Το παρόν στοιχείο στο HUMOSPRINT Ca είναι άμεσα διαθέσιμο στο φυτό, χάρις στο pH του και τις ύλες που σχηματίζει το διάλυμα, ευνοώντας την μεγέθυνση των καρπών με σταθερό τρόπο και ταυτόχρονα ενίσχυση του κυτταρικού τοιχώματος της επιδερμίδας προκειμένου να αποφευχθούν ρωγμές.

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✔ Μεγέθυνση του καρπού.
- ✔ Μεγαλύτερη αντίσταση των φύλλων.
- ✔ Καλύτερη διάρκεια ζωής.
- ✔ Δυνατό ριζικό σύστημα.
- ✔ Αντίσταση στο αβιοτικό στρες.
- ✔ Ελευθερώνει την ρίζα από συσσώρευση νατρίου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ	ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ
Εφαρμόζεται σε όλες τις καλλιέργειες	3-6 κιλά/στρ.	0,5-1 κιλό /στρ.

Συνίσταται στη βιολογική καλλιέργεια για την καλλιέργεια της μηλιάς. Το προϊόν είναι σταθερό σε συνήθεις θερμοκρασίες και πιέσεις.



MULTIACTION MYCO

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εκχύλισμα υγρής ζύμης περιέχουσας άληη καστανού χρώματος (ASCOPHYLLUM).



ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Είναι ένα φυσικό προϊόν σε υγρή μορφή ενεργοποιεί μικροοργανισμούς όλο αυτό βοηθά στην σωστή ανάπτυξη του φυτού και αυξάνει την αντοχή του σε αντίξοες συνθήκες.
- Βοηθάει το ριζικό σύστημα στην ανταλλαγή των θρεπτικών στοιχείων.
- Βοηθάει να μετατραπεί η οργανική ουσία θρεπτική για το φυτό.
- PH: 3

Το προϊόν χρησιμοποιείται για να προάγει συνέργειες με άλλα ειδικά προϊόντα διευκολύνοντας την δράση τους. Είναι σκόπιμο να δημιουργηθεί ένα μίγμα με τα διάφορα προϊόντα που πρέπει να συνδυαστεί στις διάφορες κατάλληλες αναλογίες αναμιγνύοντας σε λίγο νερό αφήνοντας τα να δράσουν για 3-4 ώρες και κατόπιν τα διανέμουμε ανάλογα με την προκαθορισμένη δοσολογία.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Οπωροκρηπεντικά σε θερμοκήπιο και υπαίθρια	Εμβάπτιση ριζών πριν την μετα-φύτευση.	200 κ.εκ./100 λίτρα
Οπωροκρηπεντικά σε θερμοκήπιο ή σε υποδομή προστασίας και υπαίθρια	Πρώτη εφαρμογή με άρδευση κατά την μεταφύτευση ή κατά τη σπορά. Επαναλαμβάνουμε 3-5 επεμβάσεις κατά την υδρόλιπανση.	500 κ.εκ./στρ. 250 κ.εκ./ στρ.
Φράουλα	Στη περίπτωση διανομής με εξοπλισμό ψεκασμού τότε να ακολουθήσει πότισμα 8 χιλιοστών ώστε να βοηθηθεί το διάλυμα να εισχωρήσει στο έδαφος.	500 κ.εκ./στρ.
Φάρμες φρούτων	Στη υδρόλιπανση κατά τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής από 2-3 επεμβάσεις.	250 κ.εκ./στρ.
Αμπέλια	Ανάλογα με τις ανάγκες, σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα όπως Rhizo Sprint και Nautilus.	200 κ.εκ./στρ.
Σιτηρά, λαχανικά, μηδική και βιομηχ/κά φυτά	Αναμιγνύετε τα προϊόντα με το σπόρο πριν την σπορά.	50 κ.εκ./στρ.
Ανθοφόρα	Στην υδρόλιπανση 3-5 επεμβάσεις συνδυασμένα με τα προϊόντα Rhizo Sprint και Nautilus.	200 κ.εκ./στρ.
Φυτώρια υπαίθρια	Επεξεργασία με έγχυση των ριζικών συσκευών. Στη υδρόλιπανση 3-5 επεμβάσεις από τη μεταμόσχευση να γίνουν οι πρώτες 2 με διάστημα 8-10 μέρες και οι άλλες ανά 14 μέρες.	200 κ.εκ./100 λίτρα 300 κ.εκ./στρ.
Γκαζόν	Μετά τη σπορά κάντε μια υδρόλιπανση με κατάλληλη ποσότητα νερού (5 mm).	400 κ.εκ./στρ.





VITA CHEMIE
FERTILIZERS & TECHNICAL MEANS

12ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Βέροιας
Τ.Θ. 1006 Άγιος Αθανάσιος, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 723 696 / Fax: 2310 723 697
Email: info@vita-chemie.com
www.siriac.com

Member of group **Siriac srl**

